

## caca n^queis 777

Exames de gravidez, geralmente chamados de testes de gravidez em casa, detectam a presen^a da gonadotrofina cori^nica humana (hCG) em urina ou sangue. A hCG ^ uma hormona produzida ap^s a fecunda^o, quando um embri^o se fixa na parede do ^tero.

/p>

No exame de gravidez caseiro, as tiras reagem ^ presen^a de hCG e mostram o resultado em minutos. Esses testes ^ est^o amplamente dispon^veis em farm^cias e drogarias e podem detectar a gravidez em diferentes momentos, dependendo do tipo de exame.

Um ^ tipo de exame de gravidez caseiro ^ o teste de gravidez de derramamento, tamb^m chamado de teste de gravidez de fluxo livre. Nesse teste, a mulher coloca algumas gotas de urina em um recipiente e, em seguida, inclina o recipiente ^ para que a urina passe sobre uma tira reagente. Esses testes detectam a presen^a de hCG a partir de 25 mUI/ml a 50 mUI/ml de urina. Portanto, eles podem detectar uma gravidez em torno de uns 4 a 5 dias ^ ap^s o atraso menstrual.

Outro tipo de exame de gravidez caseiro ^ o teste de gravidez digital. Esse teste apresenta o ^ resultado de maneira digital, o que facilita a leitura do resultado. Geralmente, os testes digitais detectam a gravidez a partir ^ de 10 mUI/ml de hCG na urina. Portanto, esses testes podem detectar uma gravidez um pouco antes do que os ^ testes de fluxo livre, geralmente em torno de 3 a 4 dias ap^s o atraso menstrual.

-----  
Autor: pittsburghscubacenter.net

Assunto: caca n^queis 777

Palavras-chave: caca n^queis 777

Tempo: 2025/1/25 7:24:31