

## vaidebet informa&#231;&#245;es

&lt;p&gt;NAC: um ant&#237;doto contra o envenenamento por paracetamol no Brasil&

lt;/p&gt;

&lt;p&gt;No Brasil, o N-acetilciste&#237;na (NAC) &#233; frequentemente utilizad  
o como ant&#237;doto contra O , &#233; o envenenamento por paracetamol, devido &#224;  
{kO} capacidade em {kO} aumentar os n&#237;veis de glutathiona no f&#237;gado. Al  
&#233;m disso, o O , &#233; NAAC &#233; tamb&#233;m usado no tratamento de DAP-ALF e h  
epatite alco&#243;lica grave, e na preven&#231;&#227;o da IN.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;O paracetamol &#233; um O , &#233; analg&#233;sico e antipir&#233;tico eficaz  
, que pode aliviar dores, dores e febre. No entanto, uma overdose desse medicame  
nto pode causar Danos O , &#233; graves no f&#237;gado. Se uma pessoa experimentar uma  
ooverdose de paracetam, a administra&#231;&#227;o de NAC dentro de 10 horas pod  
e O , &#233; ajudar a reduzir o risco de les&#245;es hep&#225;ticas associadas.&lt;/p&

gt;

&lt;p&gt;De acordo com publications m&#233;dicas, o NAC &#233; tamb&#233;m admin  
istrado por via O , &#233; intravenosa para outras indica&#231;&#245;es, tais como tra  
tamento de insufici&#234;ncia hep&#225;tica aguda doen&#231;a do f&#237;gado (DA) Tj T\*

ia renal aguda (INJ).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Embora a maior&#237;a das pessoas tomem paracetamol sem incidentes, as  
overdoses acontecem. Todos O , &#233; os anos, milhares de pessoas nos EUA sofrem de e  
feitos t&#243;xicos decorrentes de overdoes acidentais ou intencionais de parece

tam.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Em casos O , &#233; graves de overdose de paracetamol, o NAC deve ser adminis  
trado o mais r&#225;pido poss&#237;vel. Os m&#233;dicos geralmente recomendam a  
administra&#231;&#227;o O , &#233; dentro de 8 a 10 horas a seguir &#224; ingest&#227;  
o. No entanto, mesmo que mais tempo tenha passado, oNAC pode O , &#233; ainda ser ben&  
&#233;fico se o f&#237;gado ainda n&#227;o tiver sofrido danos graves.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Em alguns casos, as pessoas podem precisar de doses O , &#233; altas de NAC p  
ara tratar a overdose de paracetamol. Em tais casos, o tratamento pode durar alg  
uns dias. Em geral, O , &#233; o NAC &#233; bem tolerado, mas pode causar efeitos secu  
nd&#225;rios leves, tais como n&#225;useas, v&#244;mitos e febre.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Em qualquer caso, se O , &#233; algu&#233;m suspeitar que tenha tomado uma ov  
erdose de paracetamol, deve procurar Rapidamente a assist&#234;ncia m&#233;dica.

O NAC deve ser administrado O , &#233; o mais breve poss&#237;vel, preferencialmente  
dentro de 8 a 10 horas ap&#243;s a ingest&#227;o, para minimizar quaisquer danos  
hep&#225;ticos potenciais.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Em O , &#233; resumo, o NAC &#233; uma subst&#226;ncia vital no tratamento de  
overdoses de paracetamol no Brasil. Embora o paracetam seja um O , &#233; medicamento  
eficaz, as overdoes podem causar danos graves ao f&#237;gado. Se administrado r